

高齢者の肺炎球菌感染症の定期接種

以下の方は、公費助成によるワクチン接種を受けられる可能性があります。
公費助成の有無やその内容は、お住いの市区町村によって異なる場合があります。

定期接種対象者

以下2つを満たす方が、定期接種の対象者です。

- ☐ **65歳の方***
- ☐ これまでに定期接種の対象となる成人肺炎球菌ワクチンを接種していない方

*60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓、呼吸器の機能に自己の身の周りの日常生活活動が極度に制限される程度の障害やヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害がある方も対象となります。

厚生労働省 肺炎球菌感染症(高齢者) <https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001086212.pdf> (2024/11/7アクセス)

ニューモバックス®NPの有効性


ニューモバックス®NPは23種類の血清型を含むワクチンです。

- **髄膜炎・敗血症**などの侵襲性肺炎球菌感染症含有する血清型を42.2%予防する効果があります¹⁾。

- **肺炎***

肺炎球菌による肺炎を63.8%減少させたという報告があります²⁾。

※肺炎球菌ワクチンは、すべての肺炎を防ぐものではありません。



1) Shimbashi R, et al. *Emerg Infect Dis.* 2020;26(10):2378-2386.
2) Maruyama T, et al. *BMJ.* 2010;340:c1004.

定期接種で接種可能な期間

65歳の誕生日前日
～66歳の誕生日前日

厚生労働省 第33回新型コロナウイルスワクチンの接種体制確保に係る自治体向け説明会 資料2(令和6年2月7日)
<https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/001205639.pdf> (2024/11/7アクセス)

ワクチン接種後に現れる症状

- **接種部位の赤み、腫れ、熱、痛み。**
接種した部分が赤くなったり、腫れたり、熱を持ったり、痛むことがありますが、通常3～4日で治まります¹⁾。
- **接種部位を中心に上腕全体、あるいは腕全体にまで及ぶ赤み、腫れ、熱、痛みなどの症状。**
接種後2～3日でピークがみられることがあります²⁾。



その他、熱っぽい、だるいなど体調の変化があった場合には、医師にご相談ください。

1) 執筆・監修 予防接種ガイドライン等検討委員会、予防接種ガイドライン 2024年度版, p56.
2) Jackson LA, et al. *JAMA.* 1999;281(3):243-248.

肺炎球菌ワクチン接種に加えて、うがい、手洗い、マスクなど、日常生活での感染予防も続けてください。